

1. Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки

- a. Гістамін
- b. Гірудин
- c. Фібринолізин
- d. Лізоцим
- e. Гепарин

2. Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу у жінок

- a. Субфебрилітет
- b. Швидка втомлюваність
- c. Порушення менструального циклу
- d. Безпліддя
- e. Підвищена пітливість

3. Вкажіть місце накладання електроду з зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- a. Права рука
- b. ---
- c. Ліва рука
- d. Ліва нога
- e. Права нога

4. Вкажіть метод специфічної профілактики туберкульозу, що проводиться особам, які перебувають у контакті з пацієнтом, хворим на активну форму туберкульозу.

- a. Ревакцинація вакциною БЦЖ
- b. Хіміопротекція стрептоміцином
- c. Проведення проби Манту
- d. Хіміопротекція ізоніазидом
- e. Щеплення вакциною БЦЖ

5. Вкажіть особливість підготовки пацієнта до проведення езофагогастродуоденоскопії.

- a. Дослідження проводиться натще
- b. Вранці застосувати олійну клізму
- c. Призначити розвантажувальну дієту
- d. Напередодні застосувати харчову клізму
- e. За 1 годину до обстеження треба випити барій

6. Вкажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

- a. Затримка частин плаценти
- b. Защемлення плаценти
- c. Порушення зсідання крові
- d. Щільне прикріплення плаценти
- e. Порушення виділення плаценти

7. Вкажіть прояви дизуричного синдрому

- a. Піурія, протеїнурія
- b. Часте болісне сечовипускання
- c. Гіпертензія, набряки
- d. Позитивний симптом Пастернацького
- e. Альбумінурія, кетонурія

8. Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

- a. набряки на нижніх кінцівках
- b. пітливість
- c. підвищення температури тіла
- d. крововиливи на шкірі
- e. набряки на обличчі

9. Вкажіть тривалість прийому родонової ванни.

- a. 10-15 хв
- b. 1-2 хв
- c. 50-60 хв
- d. 30-40 хв
- e. 5-7 хв

10. Вкажіть шлях уведення контрастної речовини в кровоносне русло під час проведення холецистографії?

- a. сублінгвально
- b. підшкірно
- c. внутрішньом'язово
- d. внутрішньовенно
- e. внутрішньошкірно

11. Вода якої температури використовується для процедури постановки гірчичників?

- a. 20-25°C
- b. 25-27°C
- c. 18-20°C
- d. 39-40°C
- e. -

12. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?

- a. кишкової кровотечі
- b. розриву селезінки
- c. печінкової недостатності
- d. генералізації інфекції
- e. рецидиву захворювання

13. Для якого захворювання характерні такі зміни в загальному аналізі сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?

- a. хронічного гломерулонефриту
- b. гострого гломерулонефриту
- c. сечокам'яної хвороби
- d. ниркової недостатності
- e. гострого пієлонефриту

14. Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунку?

- a. хронічного панкреатиту
- b. цирозу печінки
- c. виразкової хвороби шлунку
- d. хронічного атрофічного гастриту

е.Хронічного гіпертрофічного гастриту

15.До гінекологічного відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 16 тижнів зі скаргами на інтенсивний переймоподібний біль унизу живота та кров'янисті виділення зі статевих шляхів. За результатами ургентного ультразвукового обстеження діагностовано неповний аборт (залишки плодового яйця залишилися в порожнині матки). До якої лікувальної маніпуляції сестрі медичній треба підготувати набір інструментів?

- а.Зондування порожнини матки
- б.Діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки
- с.Пункції заднього склепіння піхви
- д.Кольпоскопії
- е.Гістеросальпінгографії

16.До жіночої консультації звернулася жінка у терміні вагітності 36 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: обвід живота - 98 см, ВСДМ - 40 см, вислуховується серцебиття -146/хв справа вище від пупка і 160/хв зліва нижче пупка. Визначте вид вагітності.

- а.Несправжня
- б.Завмерла
- с.Переношена
- д.Багатоплідна
- е.Одноплідна

17.До пологового відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 26--27 тижнів, яка скаржитися на появу незначних кров'янистих виділень з піхви вночі, в стані спокою. На момент огляду кровотеча припинилася, загальний стан задовільний. Який метод діагностики треба провести для уточнення діагнозу в цьому разі?

- а.Зовнішнє акушерське обстеження
- б.Трансвагінальне УЗД
- с.Амніоскопію
- д.Внутрішнє акушерське обстеження
- е.Кольпоскопію

18.До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту та тупий ниючий біль в епігастральній ділянці, який виникає за 15--30 хв після вживання їжі. Захворювання пов'язує з нерегулярним харчуванням. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки блідо-рожеві, язик вкритий білим нальотом. Живіт під час пальпації м'який, болючий в епігастральній ділянці. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- а.Раку шлунку
- б.Хронічного гіпоацидного гастриту
- с.Хронічного панкреатиту
- д.Виразкової хвороби шлунку
- е.Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

19.До якої фармакологічної групи лікарських засобів відноситься діазепам?

- а.Ноотропи
- б.Антиконвульсанти
- с.Міорелаксанти
- д.Транквілізатори

е. Антидепресанти

20. До якої функціональної проби треба підготувати пацієнта зі стабільною стенокардією напруження під час виконання плану медсестринських втручань?

- а. Атропінової проба
- б. Проби із затримкою дихання
- в. Кліноортостатичної проби
- г. Синокаротидної проби
- д. Велоергометрії

21. До якого обстеження сестрі медичній треба підготувати пацієнта, у якого є припущення на ішемічний інсульт?

- а. Рентгенографії кісток черепа
- б. Магнітно-резонансної томографії
- в. Електрокардіографії
- г. Електроміографії
- д. Ехокардіографії

22. Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серцебиття, порушення смаку (бажання їсти крейду), блідість та сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Для якого виду анемії характерні ці симптоми?

- а. А.В<sub>12</sub>-дефіцитної
- б. Залізодефіцитної
- в. Фолієводефіцитної
- г. Гіпопластичної
- д. Гемолітичної

23. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці. Дихання часте, поверхневе. Температура тіла --- 37,4°C. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно над легеньми спостерігається чіткий легеневий звук. Аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- а. Негоспітальної пневмонії
- б. Сухого плевриту
- в. Гострого бронхіту
- г. Ексудативного плевриту
- д. Міжреберної невралгії

24. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла --- 37,5°C, набряк і почервоніння п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох кистей та обмеження їхньої рухомості, кисті мають вигляд <<ластів моржа>>. Який лабораторний показник найдоцільніше визначити в цьому разі?

- а. АлАТ, АсАТ
- б. С-реактивний білок
- в. Сечову кислоту
- г. Ревматоїдний фактор
- д. Білірубін

25. Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження.

- a.39%
- b.25%
- c.37%
- d.19%
- e.51%

26. Жінка після ДТП скаржиться на біль і відсутність рухів у ділянці лівої ключиці. Під час огляду виявлено вкорочення лівого надпліччя, його деформацію та набряк, згладження надключичної ямки. Для якого ушкодження характерні ці симптоми?

- a. Забою у ділянці ключиці
- b. Відкритого перелому ключиці
- c. Вивиху ключиці
- d. Перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків
- e. Перелому ключиці без зміщення кісткових уламків

27. Жінка скаржиться на гіркий присмак у роті, печію, нудоту і відрижку повітрям після вживання жирної та смаженої їжі. Для якого синдрому характерні ці клінічні прояви?

- a. Астеновегетативного синдрому
- b. Больового синдрому
- c. Інтоксикаційного синдрому
- d. Кишкової диспепсії
- e. Шлункової диспепсії

28. Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку пологової діяльності у жінки

- a. Опущення дна матки
- b. Біль у ділянці крижів
- c. Розкриття шийки матки
- d. Часте сечовипускання
- e. Регулярні перейми

29. Жінці віком 35 років діагностовано залізодефіцитну анемію. Які продукти харчування мають бути у достатній кількості в раціоні харчування жінки?

- a. М'ясні продукти
- b. Морська капуста
- c. Овочі і фрукти
- d. Молочні продукти
- e. Борошняні вироби

30. З якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла людини?

- a. Для попередження виникнення кашлю
- b. Для кращої взаємодії з назальними краплями
- c. Для підсилення лікувального ефекту
- d. Для попередження підвищення температури тіла
- e. Для уникнення запаморочення

31. За який термін часу треба зібрати сечу на дослідження для визначення вмісту глюкози?

- a. За добу
- b. За 8 год
- c.
- d. За 1 год
- e. За 10 год

32. На яку глибину вводиться газовідвідна трубка в пряму кишку дорослим пацієнтам для усунення метеоризму?

- a. 3-4 см
- b. 20-30 см
- c. 15-20 см
- d. 10-15 см
- e. 5-10 см

33. Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини, наповнених прозорою рідиною, на тлі гіперемованої шкіри?

- a. II
- b. -
- c. IV
- d. I
- e. III

34. Під час догляду за пацієнтом із хронічною серцевою недостатністю сестра медична звернула увагу на збільшення маси тіла пацієнта та зменшення виділення кількості сечі. Аналіз водного балансу встановив, що добовий діурез пацієнта становить 50% від кількості прийнятої рідини. Зробіть висновок за результатами обстеження.

- a. Порушення метаболізму
- b. Зневоднення
- c. Ожиріння
- d. -
- e. Поява прихованих набряків

35. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерний такий результат дослідження?

- a. Бронхоектатичної хвороби
- b. Бронхіальної астми
- c. Сухого плевриту
- d. Гострого бронхіту
- e. Туберкульозу легень

36. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 секунд). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?

- a. Дихання Біота
- b. Дихання Куссмауля
- c. Дихання Чейна-Стокса
- d. Експіраторна задишка
- e. Інспіраторна задишка

37. Під час обстеження роділлі виявлено, що спинка плода обернена до правої стінки матки, над входом у малий таз розташована м'яка частина плода, яка не балотує і не має чітких контурів. Яке розташування плода у порожнині матки?

- a. Друга позиція, головне передлежання
- b. Друга позиція, тазове передлежання
- c. Перша позиція, тазове передлежання
- d. Задній вид, тазове передлежання
- e. Задній вид, головне передлежання

38. Під час оцінювання стану новонародженої дитини на 1-й хвилині життя виявлено: ЧСС - 120/хв, дихання регулярне, крик голосний, шкіра рожева, рухи активні, реакція на подразники жвава. Оцініть стан новонародженого за шкалою Апгар.

- a. 7 балів
- b. 10 балів
- c. 4 бали
- d. 2 бали
- e. 5 балів

39. Під час парентерального введення камфорної олії сестра медична після введення шприца відтягнула його поршень на себе. Профілактику якого ускладнення вона виконала?

- a. Інфільтрату
- b. Повітряної емболії
- c. Медикаментозної емболії
- d. Гематоми
- e. Некрозу

40. Під час проведення внутрішнього акушерського дослідження роділлі виявлено: шийка матки згладжена та розкрита на 8 см, плодовий міхур відсутній, пальпується підборіддя, щелепи та піднебіння плода. Яке передлежання плода у порожнині матки?

- a. -
- b. Передньоголовне
- c. Лобне
- d. Лицьове
- e. Потиличне

41. Під яким кутом вводиться голка у верхньо-зовнішній квадрант сідниці під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції?

- a. 45°
- b. 70°
- c. 30°
- d. 15°
- e. 90°

42. Після роботи з електроприладами чоловік помітив на долоні правої руки біло-сіру пляму діаметром 4 мм. Який вид електротравми виник у чоловіка?

- a. Електроофтальмія
- b. Знак
- c. Опік
- d. -
- e. Металізація

43. Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення сну, схуднення на тлі підвищення апетиту. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, тремор пальців рук, шкіра волога, тепла, температура тіла - 37,2°C, пульс - 100/хв, АТ -150/90 мм рт. ст., екзофтальм, позитивний симптом Грефе, збільшення щитоподібної залози, тони серця звучні, систолічний шум на верхівці. Яке дослідження треба провести для визначення функції щитоподібної залози?

- a. Аналіз крові на тиреоїдні гормони
- b. МРТ головного мозку
- c. Загальний аналіз крові
- d. Аналіз крові на глюкозу
- e. УЗД щитоподібної залози

44. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділення відсутнє упродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Олігурія
- b. Поліурія
- c. Гостра затримка сечі
- d. Ниркова колька
- e. Ніктурія

45. Пацієнт скаржиться на біль унизу живота та часті рідкі випорожнення (спочатку калового характеру, а потім мізерні, з домішками слизу та крові по типу «ректального плевка»). Під час пальпації живота спостерігається біль та виражений спазм у ділянці сигмоподібної кишки. З боку інших органів патології не виявлено. Який лабораторний метод діагностики треба застосувати для підтвердження діагнозу?

- a. Бактеріологічний
- b. Загальний аналіз крові
- c. Біохімічний аналіз крові
- d. Аналіз крові на глюкозу
- e. Копрологічний

46. Пацієнт скаржиться на надсадний кашель, прогресуючу задишку, біль у грудній клітці, кровохаркання. Попередній діагноз - рак легень. До якого обстеження треба підготувати пацієнта для уточнення діагнозу?

- a. Електрокардіографії
- b. Бронхоскопії з біопсією
- c. Колоноскопії
- d. ФГДС із біопсією
- e. Тригоскопії

47. Пацієнт скаржиться на озноб, гарячку, профузне потовиділення, що повторюються кожні три дні. З анамнезу відомо, що тиждень тому повернувся з Африки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла 40°C, шкіра обличчя гіперемована, у легенях жорстке дихання, живіт пальпаторно безболісний, печінка та селезінка збільшені. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Грипу
- b. Лептоспірозу
- c. Вірусного гепатиту
- d. Малярії
- e. Висипного тифу



48. Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зниження апетиту, біль у суглобах упродовж двох тижнів. З анамнезу відомо, що чоловік вживає ін'єкційні наркотики. Під час об'єктивного обстеження виявлено: жовтяниця шкіри і склер, збільшення печінки та селезінки, сеча темного кольору, випорожнення знебарвлені. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- a. ВІЛ-інфекції
- b. Лептоспірозу
- c. Вірусного гепатиту С
- d. Висипного тифу
- e. Кишкового ієрсиніозу

49. Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького, повідомив сестру медичну про те, що не може зібрати сечу в третій контейнер, у зв'язку з відсутністю позиву до сечовипускання. Яка тактика сестри медичної у цьому разі?

- a. Увести пацієнту сечогінний препарат
- b. Застосувати методи рефлекторного виклику акту сечовипускання
- c. Виконати катетеризацію сечового міхура
- d. Дати пацієнту випити води
- e. Третій контейнер залишити порожнім

50. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель із виділенням гнійного з неприємним запахом мокротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Раку легень
- b. Абсцесу легень
- c. Пневмосклерозу
- d. Гострого бронхіту
- e. Вогнищевої пневмонії

51. Пацієнтка після апендектомії скаржиться на дворазове блювання, затримку газів і відсутність випорожнень. Об'єктивно спостерігається: шкіра землистого кольору, язик сухий, обкладений білим нальотом, передня черевна стінка напружена. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки в ранньому післяопераційному періоді?

- a. Гострий аднексит
- b. Гострий панкреатит
- c. Парез кишечника
- d. Гострий перитоніт
- e. Гострий холецистит

52. Пацієнтка після струмектомії скаржиться на млявість, загальну слабкість, зниження працездатності та пам'яті, мерзлякуватість, підвищену сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, не береться в складку, волосся сухе, ламке, випадає. Пульс -54/хв, ритмічний, АТ-100/60 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Акромегалії
- b. Цукрового діабету
- c. Гіпотиреозу
- d. Атеросклерозу
- e. Гіпертиреозу

53. Пацієнту ендокринологічного відділення за призначенням лікаря треба підшкірно ввести 36 МО інсуліну (1 мл інсуліну містить 40 МО). Який об'єм розчину лікарського засобу треба набрати в шприц?

- a. 0,6 мл
- b. 0,7 мл
- c. 1,0 мл
- d. 0,8 мл
- e. 0,9 мл

54. Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба I ст., призначено електрофорез із 5% розчином сульфату магнію. Яка методика проведення процедури використовується у цьому разі?

- a. Електрофорез по Келату
- b. -
- c. Півмаска Бергоньє
- d. Гальванічний комір за Щербаком
- e. Електрофорез за Вермелем

55. Пацієнту з діагнозом: неврастенія, гіперстенічна форма, призначено бром-електрофорез за методикою Вермеля. Як треба розташувати електроди у цьому разі?

- a. Один електрод між лопатками, другий --- на литкові м'язи
- b. Один електрод між лопатками, другий --- на грудну клітку
- c. Один електрод на потилицю, другий --- на попереково-крижову ділянку
- d. Один електрод на низ живота, другий --- на попереково-крижову ділянку
- e. Обидва електроди між правою та лівою лопатками

56. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього захворювання?

- a. Каламутний
- b. Жовтувато-зеленуватий
- c. Прозорий
- d. Безбарвний
- e. Червоний

57. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4% розчину гентаміцину сульфату. В ампулах по 2 мл міститься 80 мг цього антибіотика. Скільки мілілітрів препарату треба набрати в шприц для виконання ін'єкції?

- a. 1 мл
- b. 1,5 мл
- c. 3 мл
- d. 2 мл
- e. 0,5 мл

58. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 800 000 ОД антибіотика (флакон містить 1 000 000 ОД). Сестра медична розчинила його у співвідношенні 1 : 2 (1 мл розчинника на 200 000 ОД антибіотика). Який об'єм лікарського засобу треба увести пацієнту внутрішньом'язово?

- a. 4 мл
- b. 3 мл

- c. 5 мл
- d. 10 мл
- e. 8 мл

59.Породілля на 4 добу після пологів скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39°C та гнійно-кров'янисті, каламутні, з неприємним запахом виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка м'якої консистенції, чутлива під час пальпації. Яке ускладнення післяпологового періоду розвинулося у жінки?

- a. Гострий аднексит
- b. Гострий кольпіт
- c. Гострий ендометрит
- d. Гострий перитоніт
- e. Гострий пельвіоперитоніт

60.Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчували в повітрі специфічний запах «тухлих яєць». За одну годину після цього в них з'явилися сльозотеча, різі в очах, кашель, нежить, задишка, біль у грудях, головний біль, запаморочення, нудота. Для отруєння якою хімічною речовиною характерні ці симптоми?

- a. Аміаком
- b. Фосгеном
- c. Сірководнем
- d. Хлором
- e. Вуглецю оксидом

61.Семирічна дитина скаржиться на біль в епігастрії, періодичні нудоту, відрижку повітрям, печію, відчуття важкості у шлунку. Які особливості підготовки дитини до дослідження на *Helicobacter Pylori*?

- a. Уникати чищення зубів і полоскання рота зранку перед дослідженням
- b. Приймати проносні засоби упродовж 3-х днів до дослідження
- c. Застосувати очисну клізму напередодні
- d. Перед обстеженням збільшити вживання рідини
- e. Припинити приймання антибіотиків за 4--6 тижнів до дослідження

62.Сестра медична у пологовому будинку проводить підготовку новонародженої дитини з масою тіла 2300 г до щеплення проти туберкульозу. Яку вакцину вона застосує?

- a. Пентаксім
- b. Пріорікс
- c. БЦЖ
- d. Інфанрікс
- e. БЦЖ-М

63.Споживання продуктів зі збагачених вмістом якого мікроелементу треба порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- a. Кальцію
- b. Заліза
- c. Калію
- d. Магнію
- e. Натрію

64.У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого

та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Мікроспорії
- b. Висівкоподібного лишаю
- c. Дерматиту
- d. Токсикодермії
- e. Екземи

65. У жінки в терміні вагітності 33 тижні спостерігається збільшення маси тіла -500 г за тиждень та підвищення АТ --- 150/90 мм рт. ст. Яке додаткове лабораторне дослідження треба провести жінці насамперед?

- a. Біохімічний аналіз крові
- b. Бактеріологічне дослідження сечі
- c. Визначення білка в сечі
- d. Загальний аналіз крові
- e. Коагулограма

66. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс - 100/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття 160/хв, ритмічне. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- b. Неповне передлежання плаценти
- c. Загроза розриву матки
- d. Аборт у ході
- e. Розрив матки, що відбувся

67. У жінки в терміні вагітності 35-36 тижнів спостерігаються головний біль, нудота, блювання, миготіння мушок перед очима, генералізовані набряки. Під час огляду виявлено: жінка загальмована, артеріальний тиск -185/110 мм рт. ст, матка збільшена відповідно до терміну вагітності, в нормотонусі, положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття плода чітке, ритмічне, 140/хв. В аналізі сечі протеїнурія - 6 г/л. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- a. Артеріальної гіпертензії
- b. Преєклампсії легкого ступеня
- c. Преєклампсії середнього ступеня
- d. Преєклампсії тяжкого ступеня
- e. Еклампсії

68. У жінки на 31 тижні вагітності розпочалися пологи та з'явилася кровотеча з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: шийка матки розкрита на 8 см, внутрішнє вічко на 1/3 перекрите м'якою, губчастою тканиною, поруч пальпується навколоплідний міхур. У роділлі спостерігається активна пологова діяльність. Вкажіть вид передлежання плаценти.

- a. Центральне
- b. Оболонкове
- c. Крайове
- d. Низьке
- e. Бокове

69. У жінки на другий день після діагностичного вишкрібання порожнини матки підвищилася температура тіла до 38°C, з'явилися біль унизу живота та слизово-гнійні виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка збільшена, болюча, м'яка. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування цього ускладнення?

- a. Цитостатики
- b. Антибактеріальні
- c. Гемостатики
- d. Седативні
- e. Глюкокортикоїди

70. У пацієнта інфекційного стаціонару спостерігається тяжкий загальний стан, акроціаноз, сухість шкіри, загострення рис обличчя, блювання «фонтаном», діарея більше 15 разів на добу, періодичні судоми. Випорожнення водянисті, каламутні, з білими пластівцями. Який механізм розвитку діареї у пацієнта?

- a. Осмотичний
- b. Запальний
- c. Ексудативний
- d. Інвазивний
- e. Секреторний

71. У пацієнта з інсультом спостерігається часткове обмеження довільних рухів у правих кінцівках із підвищенням м'язового тону та фізіологічних рефлексів. Який це вид рухового порушення?

- a. Периферична геміплегія
- b. Центральний геміпарез
- c. Центральний парепарез
- d. Центральна геміплегія
- e. Периферичний геміпарез

72. У пацієнта з діагнозом: пневмонія, підвищилася температура тіла до 39,0°C, шкіра червона, гаряча на дотик, волога. Яку тактику треба застосувати сестрі медичній для зниження температури пацієнту?

- a. Фізичні методи охолодження
- b. Накласти зігрівальний компрес
- c. Обкласти грілками
- d. Поставити банки
- e. Поставити гірчичники

73. У пацієнта з діагнозом: хронічна ниркова недостатність, розвинулася уремія. Який симптом характерний для цього патологічного стану?

- a. Аміачний запах з рота
- b. Збільшення лімфатичних вузлів
- c. Підвищення температури тіла
- d. Підвищення апетиту
- e. Гіперемія шкірних покривів

74. У пацієнта попередній діагноз: загострення хронічного панкреатиту. Яке дослідження проводиться для уточнення діагнозу?

- a. Аналіз крові на креатинін
- b. Аналіз сечі на глюкозу
- c. Аналіз крові на білірубін
- d. Аналіз калу на приховану кров

е. Аналіз сечі на  $\alpha$ -амілазу

75. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігаються у разі цього невідкладного стану?

- а. Брадикардія, зниження АТ
- б. Тахікардія, підвищення АТ
- в. Тахікардія, зниження АТ
- г. Брадикардія, підвищення АТ
- е. Аритмія, АТ не змінюється

76. У пацієнтки з ожирінням під час обстеження в ділянці живота та стегон виявлено надлишкове, рівномірне розподілення жирової тканини. Який це вид ожиріння?

- а. Церебральне
- б. Гіпотиреоїдне
- в. Диспластичне
- г. -
- е. Аліментарно-конституційне

77. У пологовому будинку новонародженій дитині на 3-й день життя заплановано проведення щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Який спосіб уведення цієї вакцини?

- а. Внутрішньошкірно
- б. Підшкірно
- в. Внутрішньом'язово
- г. Перорально
- е. Внутрішньовенно

78. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість, облісіння потилиці, здуття живота. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- а. Спазмофілії
- б. Рахіту
- в. Гіпотрофії
- г. Гіпервітамінозу D
- е. Алергічного діатезу

79. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дрібних пухирців із гнійним умістом, покритих жовтими кірками, піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?

- а. Сикозу
- б. Імпетиго
- в. Мікроспорії
- г. Кандидозу
- е. Фурункулу

80. У чоловіка віком 54 роки спостерігається головний біль, шум у вухах, запаморочення та стійке підвищення артеріального тиску (АТ --- 160/100 мм рт. ст). Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- а. Стенокардія

- b.Інфаркт міокарда
- c.Ішемічний інсульт
- d.Серцева астма
- e.Артеріальна гіпертензія

81. У чоловіка віком 58 років, який хворіє на цироз печінки, раптово з'явилися такі симптоми: збудження змінилося на сонливість, нудота, блювання, посмикування м'язів обличчя та кінцівок, з рота відчувається запах аміаку, температура тіла 39-40°C, спостерігається дихання Чейна-Стокса. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- a.Пенетрація
- b.Печінкова кома
- c.Перфорація
- d.Шлункова кровотеча
- e.Бактеріальний перитоніт

82. У чоловіка віком 65 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово розвинувся напад задишки та кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- a.Бронхіальної астми
- b.Туберкульозу
- c.Набряку легень
- d.Серцевої астми
- e.Інфаркту міокарда

83. У чоловіка виявлено відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. Який тимчасовий метод спинення кровотечі потрібно застосувати в цьому разі?

- a.Туга тампонада рани
- b.Тиснуча пов'язка
- c.Накладання артеріального джгута
- d.Підвищене положення кінцівки
- e.Максимальне згинання кінцівки в суглобі

84. У чоловіка після значного фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці, що іррадіює вниз живота, часте болісне сечовипускання, виділення кров'янистої сечі. Пацієнт збуджений, спостерігається блювання. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a.Харчове отруєння
- b.Гостра затримка сечі
- c.-
- d.Напад ниркової кольки
- e.Напад жовчної кольки

85. У чоловіка розвинувся напад задишки з різко утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною, сухий кашель. Об'єктивно спостерігається: положення ортопное, акроціаноз, на відстані чути свистячі хрипи. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a.Напад ниркової кольки
- b.Набряк Квінке

- c. Напад серцевої астми
- d. Напад бронхіальної астми
- e. Напад ларингостенозу

86. У чотирирічної дитини спостерігаються напади спазматичного кашлю з репризами. Який матеріал треба взяти для проведення лабораторного дослідження у цьому разі?

- a. Змиви із носоглотки
- b. Мокротиння
- c. Промивні води шлунку
- d. Промивні води бронхів
- e. Слиз методом кашльових пластинок

87. У юнака віком 20 років після укусу бджоли з'явилися: щільний набряк повік і губ, захриплість голосу, «гавкаючий» кашель, відчуття нестачі повітря. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, дихання утруднене, обличчя бліде та набрякле, ціаноз губ. Пульс - 86/хв, ритмічний, АТ - 120/80 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Синдром Лайєлла
- b. набряк Квінке
- c. Кропив'янка
- d. Астматичний стан
- e. Анафілактичний шок

88. У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?

- a. Вірусологічній
- b. Бактеріологічній
- c. Клінічній
- d. Імунологічній
- e. Біохімічній

89. Ускладненням якого захворювання є кретинізм?

- a. Хвороби Аддісона
- b. Вродженого гіпотиреозу
- c. Хвороби Іценко-Кушинга
- d. Нецукрового діабету
- e. Цукрового діабету

90. Чим треба насамперед промити рану після укусу собаки до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- a. Розчином фурациліну
- b. Мильним розчином
- c. Розчином бетадину
- d. 10% розчином натрію хлориду
- e. -

91. Чоловік віком 45 років після емоційного перенапруження раптом відчув різкий головний біль, спостерігається блювання. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Визначається ригідність потиличних м'язів. Артеріальний тиск - 200/110 мм рт. ст. Отриманий у результаті люмбальної пункції ліквор забарвлений кров'ю. Для якого захворювання це характерно?

- a. Субарахноїдального крововиливу
- b. Транзиторного порушення мозкового кровообігу



- с. Дисциркуляторної енцефалопатії
- д. Ішемічного інсульту
- е. Геморагічного інсульту

92. Чоловік віком 45 років скаржиться на різкий біль у потиличній ділянці голови, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, обличчя гіперемоване, пульс -92/хв, напружений, ритмічний, АТ -190/100 мм рт. ст., тони серця ослаблені, акцент другого тону над аортою. Який препарат використовується для надання невідкладної допомоги у цьому разі?

- а. Кордіамін
- б. Анальгін
- с. Димедрол
- д. Магнію сульфат
- е. Адреналін

93. Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіння шкіри, тупий ниючий біль у правому підребер'ї, здуття живота, закрепи, що чергуються з діареєю. Об'єктивно спостерігається: збільшення печінки, судинні зірочки на шкірі, розширення венозної сітки навколо пупка, асцит, гінекомастія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- а. Вірусного гепатиту
- б. Хронічного холециститу
- с. Хронічного гепатиту
- д. Цирозу печінки
- е. Жовчнокам'яної хвороби

94. Чоловік віком 50 років скаржиться на різкий, інтенсивний, стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, ліве плече та ліву лопатку. Біль триває упродовж двох годин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, ціаноз губ, пульс -84/хв, ритмічний, АТ -130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ спостерігається патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і V1- V2. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

- а. -
- б. Q-інфаркт міокарда, астматична форма
- с. Q-інфаркт міокарда, ангінозна форма
- д. Q-інфаркт міокарда, аритмічна форма
- е. Q-інфаркт міокарда, гастралгічна форма

95. Чоловік віком 54 роки скаржиться на гіркоту в роті та тупий ниючий біль у правому підребер'ї, що виникає після вживання смаженої їжі та іррадіює в ділянку правого плеча. Під час пальпації живота спостерігаються болючість у ділянці правого підребер'я та позитивні симптоми Ортнера, Кера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- а. Гострого гастриту
- б. Гострого гепатиту
- с. Гострого холециститу
- д. Гострого панкреатиту
- е. Гострого коліту

96. Чоловік віком 58 років із тривалим рецидивним перебігом виразкової хвороби шлунку скаржиться на біль в епігастрії постійного характеру, що іррадіює в спину, значне схуднення, відразу до м'ясної їжі. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося у пацієнта?

- а. Шлункова кровотеча
- б. Пенетрація
- с. Перфорація
- д. Малігнізація

е.Пілоростеноз

97.Чоловік віком 79 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на озноб, пітливість, слабкість, задишку та появу нестерпного болю в ділянці серця, що поширюється на ліву руку та не проходить після приймання нітрогліцерину. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- a.Стенокардії
- b.Пневмонії
- c.Серцевої астми
- d.Артеріальної гіпертензії
- e.Інфаркту міокарда

98.Чоловік скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та різкий розпираючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Під час огляду виявлено щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7--8 см, різко болючий під час пальпації, покритий дрібними множинними отворами, з яких виділяється гнійна рідина. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a.Бешихи
- b.Контагіозного моллюска
- c.Дерматофітії
- d.Фурункулу
- e.Карбункулу

99.Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт приймає участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для обстеження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?

- a.Комп'ютерна томографія
- b.Іригоскопія
- c.Колоноскопія
- d.Оглядовий рентген-знімок черевної порожнини
- e.УЗД

100.Чоловік скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок виявлено червоні плями, пухирі різних розмірів, подряпини, АТ -120/80 мм рт.ст, пульс -82 уд/хв. Яке захворювання розвинулося у чоловіка?

- a.Анафілактичний шок
- b.Геморагічний васкуліт
- c.Короста
- d.Кропив'янка
- e.Набряк Квінке

101.Чоловік скаржиться на сильний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нудоту. Пацієнт збуджений, метушливий. Під час огляду шкірні покриви бліді, симптом Пастернацького позитивний з правого боку. Яку тактику треба застосувати насамперед для полегшення стану пацієнта?

- a.Тепло на поперекову ділянку
- b.Уведення сечогінних препаратів
- c.Уведення знеболювальних засобів
- d.Холод на поперекову ділянку
- e.Уведення спазмолітичних препаратів

102. Чоловік упродовж 10-ти років хворіє на дерматологічне захворювання, що загострюється в осінньо-зимовий період. Під час огляду виявлено: на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок спостерігаються рожево-червоні плями та бляшки, покриті сухими сріблястими лусочками, незначний свербіж. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Псоріазу
- b. Червоного плоского лишая
- c. Нейродерміту
- d. Системного червоного вовчаку
- e. Сухої себореї

103. Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці на світло не реагують, гіперемія обличчя, пульс -110/хв, напружений, АТ -200/110 мм рт. ст., лівий кут рота опущений, лівостороння геміплегія. Яке положення тіла треба надати пацієнту під час надання допомоги?

- a. На лівому боці, з відхиленою назад головою
- b. На животі, з повернутою на бік головою
- c. На спині, з піднятим ножним кінцем ліжка
- d. На спині, з піднятим головним кінцем ліжка
- e. На правому боці, з відхиленою назад головою

104. Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?

- a. Антигістамінна
- b. Антисекреторна
- c. Бактерицидна
- d. Бактеріостатична
- e. Спазмолітична

105. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішньошкірно. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- a. Холодний абсцес
- b. Інфільтрат
- c. Олійна емболія
- d. Ліподистрофія
- e. Виразка

106. Як називається виробничий фактор, вплив якого призводить до погіршення стану здоров'я і зниження працездатності працівника?

- a. Шкідливий
- b. Допустимий
- c. -
- d. Небезпечний
- e. Оптимальний

107. Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?

- a. Езофагогастродуоденоскопія
- b. Ректороманоскопія
- c. Бронхоскопія
- d. Колоноскопія
- e. Цистоскопія

108. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- a. Спірографія
- b. Шкірні алергологічні тести
- c. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- d. УЗД легень
- e. Бронхоскопія

109. Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характеризується повною резистентністю до бронхолітичних засобів?

- a. набряк легень
- b. Анафілактичний шок
- c. Легенева кровотеча
- d. Астматичний статус
- e. Кардіогенний шок

110. Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості у ньому?

- a. Полікістоз
- b. Артрит
- c. Поліартрит
- d. Артроз
- e. Арталгія

111. Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?

- a. Поліурія
- b. Ніктурія
- c. Олігурія
- d. Полакіурія
- e. Дизурія

112. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- a. Лапароскопія
- b. Кольпоскопія
- c. Пертубація
- d. Гідротубація
- e. Гістероскопія

113. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньо-внутрішнього краю лобкового симфізу?

- a. Косий
- b. Поперечний
- c. -
- d. Інтерспінальний
- e. Прямий

114. Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування пацієнтів із невиліковними хворобами?

- a. Хоспіс
- b. Санаторій
- c. Клініка

- d. Поліклініка
- e. Амбулаторія

115. Як називається спосіб комунікації, пов'язаний з використанням слів (мови) для передачі інформації?

- a. Дистанційна
- b. Невербальна
- c. Виховна
- d. Офіційна
- e. Вербальна

116. Які заходи (дії) треба включити сестрі медичній у план догляду за пацієнтом з геморагічним інсультом?

- a. Профілактику гіпостатичної пневмонії
- b. Уведення анальгетиків
- c. Зняття ЕКГ
- d. Уведення протиблювотних засобів
- e. Промивання шлунку

117. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- a. Анурія, свербіж шкіри
- b. Гіпертензія, набряки
- c. -
- d. Гарячка, біль у поперековій ділянці
- e. Тахікардія, сеча кольору м'ясних помий

118. Які клінічні прояви найхарактерніші для системної склеродермії?

- a. Параорбітальний набряк із пігментацією
- b. Деформації пальців рук у вигляді; плавників моржа
- c. Кільцеподібна еритема на руках і тулубі
- d. Еритематозна висипка на обличчі у вигляді; метелика
- e. Маскоподібне обличчя, рот у вигляді кисету

119. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого гломерулонефриту?

- a. Гіпертермія, гіпотензія
- b. Гарячка, часте і болісне сечовипускання
- c. Гіпертензія, набряки
- d. Гіпотензія, біль у поперековій ділянці
- e. Анурія, свербіж шкіри

120. Які лікарські засоби застосовуються впродовж усього життя як замісна терапія пацієнтам після струмектомії або тиреоїдектомії?

- a. Тиреоїдні гормони
- b. Транквілізатори
- c. Антибіотики
- d. Наркотичні анальгетики
- e. Антидепресанти

121. Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?

- a. Частота та ритмічність пульсу
- b. Частота, тривалість та інтенсивність переїм
- c. Температура тіла
- d. Артеріальний тиск
- e. Серцебиття плода

122. Які продукти треба обмежити в харчовому раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота та метеоризм?

- a. Яйця, гречану крупу
- b. Капусту, бобові
- c. М'ясо, печінку
- d. Яблука, гарбуз
- e. Каву, міцний чай

123. Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?

- a. Фототерапію
- b. Зігрівальний компрес
- c. ЛФК, масаж
- d. УФО
- e. Пірудотерапію

124. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?

- a. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- b. Передня поверхня стегна
- c. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча
- d. Підлопаткова ділянка
- e. Верхній зовнішній квадрант сідниці

125. Яка група лікарських засобів застосовується для лікування рухових порушень після травми мозку?

- a. Міорелаксанти
- b. Антikonвульсанти
- c. Антихолінестеразні
- d. Кортикостероїди
- e. Ноотропи

126. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування алергічних захворювань?

- a. Антиагреганти
- b. Антациди
- c. Антидепресанти
- d. Антагоністи кальцію
- e. Антигістамінні

127. Яка контрастна речовина використовується для ректального введення під час рентгенологічного обстеження товстої кишки?

- a. Барію сульфат
- b. Біліграфін
- c. Холевід
- d. Уротраст

е.Верографін

128. Яка кровотеча супроводжується виділенням яскраво-червоної пінистої крові під час кашлю?

- а. Шлункова
- б. Легенева
- с. Кишкова
- д. Носова
- е. -

129. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

- а. NIHSS
- б. ABCDE
- с. FAST
- д. NRS
- е. MMSE

130. Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

- а. Холецистографію
- б. Бронхоскопію
- с. Тригоскопію
- д. УЗД
- е. Ректороманоскопію

131. Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок?

- а. На спині, з припіднятими ногами
- б. На животі
- с. На спині, з повернутою на бік головою
- д. Напівсидяче
- е. На лівому боці

132. Яке специфічне місцеве ускладнення інсулінотерапії виникає у разі введення інсуліну в одне й теж місце?

- а. Ліподистрофія
- б. Інфільтрат
- с. Абсцес
- д. Некроз
- е. Гематома

133. Яке ускладнення розвивається як наслідок ревматоїдного артрити?

- а. Анкілоз
- б. Гарячка
- с. Астенія
- д. Невралгія
- е. Адинамія

134. Який із наведених нижче методів дослідження найінформативніший для діагностики туберкульозу легень?

- a. Спірометрія
- b. Біохімічний аналіз крові
- c. Рентгенографія органів грудної клітки
- d. Стернальна пункція
- e. Загальний аналіз крові

135. Який вигляд мокротиння характерний для раку легень?

- a. Пінисте рожеве
- b. Іржаве
- c. Перлинне
- d. Склоподібне
- e. Малинового желе

136. Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- a. За Вишневським
- b. Інфільтраційна
- c. За Оберстом-Лукашевичем
- d. Внутрішньокісткова
- e. Термінальна

137. Який засіб контрацепції використовується для запобігання незапланованої вагітності та інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом?

- a. Презерватив
- b. Хірургічна стерилізація
- c. Шийковий ковпачок
- d. Внутрішньоматкова спіраль
- e. Сперміциди

138. Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?

- a. Епідермальний стафілокок
- b. Анаеробні коки
- c. Протей
- d. Золотистий стафілокок
- e. Стрептокок

139. Який лікарський засіб використовується у разі консервативного лікування тиреотоксикозу для пригнічення секреції тиреоїдних гормонів?

- a. Глюкоза
- b. Новокаїн
- c. Преднізолон
- d. Інсулі
- e. Мерказоліл

140. Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнту з анафілактичним шоком?

- a. Диклофенак
- b. Атропін
- c. Еритроміцин



- d.Епінефрин
- e.Ампіцилін

141. Який метод дослідження використовується для діагностики лейкозів?

- a. Біохімічний аналіз крові
- b. Загальний аналіз сечі
- c. Імунологічний аналіз крові
- d. Коагулограма
- e. Стернальна пункція

142. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- a. -
- b. За Аддіс-Каковським
- c. За Зимницьким
- d. За Амбурже
- e. За Нечипоренко

143. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- a. Бактеріологічний
- b. Візуальний
- c. Хімічний
- d. Фізичний
- e. Інструментальний

144. Який препарат із групи нейролептиків використовується у пацієнтів з діагнозом: шизофренія, для усунення психомоторного збудження, що супроводжується галюцинаціями та маячними ідеями?

- a. Димедрол
- b. Пірацетам
- c. Аміназин
- d. Налоксон
- e. Натрію оксибутират

145. Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолея?

- a. 5% р-н глюкози
- b. 3% р-н хлораміну
- c. 0,02% р-н фурациліну
- d. 6% р-н перекису водню
- e. 2% р-н натрію гідрокарбонату

146. Який симптом є часто позитивним у разі захворювань нирок?

- a. Кера
- b. Бабінського
- c. Щоткіна-Блюмберга
- d. Пастернацького
- e. Ортнера

147. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- a. Мерзлякуватість
- b. Ціаноз шкіри
- c. Свербіж шкіри
- d. Іктеричність шкіри
- e. Сльозотеча

148. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для нападу бронхіальної астми?

- a. Шум тертя плеври
- b. Біль у грудній клітці
- c. Експіраторна задишка
- d. Інспіраторна задишка
- e. Крепітація

149. Який тип мінеральної води треба порекомендувати вживати пацієнту, у якого під час обстеження виявлено наявність сечокислих каменів у нирках?

- a. Сульфатну
- b. Вуглекислу
- c. Гідрокарбонатну (лужну)
- d. Сірководневу
- e. Хлоридну

150. Яким способом проводиться дренажування плевральної порожнини для видалення повітря у разі пневмотораксу?

- a. Стрічковим дренажем
- b. Трубчастим дренажем
- c. По Суботіну
- d. Мікроіригатором
- e. По Бюлау

151. У породіллі після народження посліду посилилась кровотеча. Матка м'яка, погано скорочується, при огляді плаценти виявлено дефект часточки посліду. Яка акушерська маніпуляція застосовується у цьому разі?

- A. Ручної ревізії порожнини матки
- B. Огляду пологових шляхів
- C. Масажу матки на кулаці
- D. Зовнішнього масажу матки
- E. Введення токолітичних препаратів

152. Пацієнтка 45 років доставлена до гінекологічного відділення з матковою кровотечею. При огляді виявлено, що шкірні покриви та слизові оболонки бліді, у пацієнтки загальна слабкість. З анамнезу відомо, що менструації нерегулярні, рясні. Вкажіть, до якого діагностичного дослідження слід підготувати пацієнтку?

- A. Кульдоскопії
- B. Цервікоскопії
- C. Лапароскопії
- D. Гістероскопії
- E. Кольпоскопії

153. У роділлі 4 години тому почалися перейми, по 25-30 секунд через кожні 8 хвилин, під час піхвового обстеження встановлено: шийка матки м'яка, згладжена, розкриття 5 см, плодовий міхур відсутній, передлежить голівка. Вкажіть, який період пологів?

- A Другий
- B Провісників
- C Перший
- D Третій
- E Післяпологовий

154. Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть, ознаку початку пологової діяльності у жінки?


- A Розкриття шийки матки
- B Часте сечопускання
- C Регулярні перейми
- D Опущення дна матки
- E Біль у ділянці крижів

155. Породілля на 4 добу після пологів скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39°C та гнійно-кров'янисті, каламутні, з неприємним запахом виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка м'якої консистенції, чутлива під час пальпації. Яке ускладнення післяпологового періоду розвинулося у жінки?

- A Гострий пельвіоперитоніт
- B Гострий ендометрит
- C Гострий перитоніт
- D Гострий кольпіт
- E Гострий аднексит

156. На малюнку представлено набір для вишкрібання порожнини матки. Вкажіть, номер інструмента, який використовують для фіксації шийки матки.

- A 1
- B 4
- C 3
- D 2
- E 5



157. До чоловіка 30 років викликано фельдшера центру екстреної медичної допомоги. Пацієнт в коматозному стані. Зі слів родичів, хворіє цукровим діабетом впродовж 10 років. Об'єктивно встановлено: шкіра суха, холодна на дотик, очні яблука при натискуванні м'які, глибоке та шумне дихання Куссмауля з різким запахом ацетону. пульс – 90 уд/хв, слабкого наповнення. АТ – 90/50 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A Уремична кома
- B Печінкова кома
- C Гіперглікемічна кома
- D Гіпоглікемічна кома
- E Гіпотиреоїдна кома

158. Доставлено 45-річну пацієнтку в приймальне відділення ЦРЛ зі скаргами на серцебиття, перебої в роботі серця. Результати діагностичного обстеження:

ЧСС - 105 уд./хв., АТ - 150/95 мм. рт. ст. ЕКГ показало: після кожних трьох нормальних комплексів QRS з'являється позачерговий деформований комплекс QRS. Встановіть попередній діагноз.

- A Фібриляція шлуночків
- B Передсердна екстрасистолія
- C Синусова брадикардія
- D Миготлива аритмія
- E Шлуночкова екстрасистолія

159. Вас викликали до 34-річної пацієнтки зі скаргами на сильний біль у поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи. Встановлений попередній діагноз: нирковокам'яна хвороба, напад ниркової кольки. Що потрібно призначити насамперед?

- A Контрикал
- B Преднізолон
- C Баралгін
- D Фуросемід
- E Амоксицилін

160. У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив пацієнт з підозрою на шигельоз. Який матеріал потрібно взяти на дослідження?

- A. Випорожнення
- B. Сечу
- C. Жовч
- D. Мокротиння
- E. Кров

161. Осіб, які були в осередку хвороби в контакт з хворими холерою, госпіталізують у:

- A. Інфекційне відділення
- B. Холерний госпіталь
- C. Провізорний госпіталь
- D. Інфекційну лікарню
- E. Обсерваційний ізолятор

162. Метод лабораторної діагностики черевного тифу протягом гарячкового періоду

- A. Шкірно-алергічний
- B. Серологічний
- C. Виділення гемокультури

- D. Експериментальний
- E. Мікроскопічний

163. У жінки підозра на гіперплазію ендометрія. Який інструмент потрібно підготувати для аспіраційної біопсії слизової оболонки матки.

- A. Скальпель
- B. Пайпель
- C. Конхотом
- D. Корцанг
- E. Пінцет

164. Хворий Т. 43 р. скаржиться на різкий біль в ділянці заднього проходу, підвищення температури тіла до 39°C. Захворів раптово через 3 доби після переохолодження. Об'єктивно: набряк та гіперемія в періанальній ділянці, при пальпації болючість, флюктуація. Для якого захворювання характерні ці ознаки?

- A. Гострого парапроктиту
- B. Раку прямої кишки
- C. Геморою
- D. Анальної тріщини
- E. Ентероколіту

165. У хворого Б. 35 р. з травмою грудної клітки швидко прогресують розлади дихання та серцевої діяльності внаслідок клапанного (напруженого) пневмотораксу. Яка невідкладна допомога показана хворому?

- A. Пункція плевральної порожнини
- B. Переливання крові
- C. Оксигенотерапія
- D. Знеболення
- E. Трахеостомія

166. Для якого захворювання характерний симптом переміжної кульгавості?

- A. Лімфостазу
- B. Тромбофлебиту поверхневих вен
- C. Тромбозу глибоких вен
- D. Облітеруючого атеросклерозу
- E. Варикозної хвороби

167. Під час огляду 5-річної дитини лікар запідозрив захворювання коартацію аорти. Призначив медичній сестрі виміряти АТ на нижніх кінцівках. Вкажіть положення тіла, яке потрібно надати дитині під час даної маніпуляції.

- A. Лежачи на боку
- B. Лежачи на спині
- C. Лежачи на животі
- D. Сидячи на стільці
- E. Стоячи на ногах

168. У дитини 7 років спостерігаються скарги на кашель, підвищення температури тіла до 38,5°C. В анамнезі зазначається, що вона хворіє на COVID-19 протягом тижня. Об'єктивно встановлено: ЧД 48/хв, ЧСС 100/хв, периоральний ціаноз, втягіння міжреберних проміжків.

Який необхідно провести неінвазивний метод обстеження для визначення сатурації крові киснем?

- A. Пульсоксиметрію
- B. Глюкометрію
- C. Пікфлуометрію
- D. Рентгенографію ОГК
- E. Пневмотахометрію

169. Під час медсестринського обстеження, сестра медична проводила дослідження властивостей пульсу. Вона виявила, що у 5-річного хлопчика частота пульсу 145/хв. Дайте оцінку отриманого результату.

- A. Гіпертензія
- B. Аритмія
- C. Асистолія
- D. Брадикардія
- E. Тахікардія

170. 10-річний хлопчик проходить профілактичний огляд у кабінеті лікаря загальної практики. Під час медсестринського обстеження, сестра медична провела пробу Руф'є. Вкажіть, для діагностики функціонального стану якої системи організму.

- A. Серцево-судинної
- B. Сечовидільної
- C. Ендокринної
- D. Дихальної
- E. Травної

171. Дитина 3 років доставлена до інфекційного відділення зі скаргами на біль у горлі. В анамнезі зазначається, що хворіє другий день, хвороба розпочалась із підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно встановлено: гіпертрофію мигдаликів, гній в лакунах. На гіперемованій шкірі дрібноточкова яскраво-червона висипка, блідий носогубний трикутник. Вкажіть тривалість ізоляції дитини при даному захворюванні

- A. 10 днів
- B. 7 днів
- C. 22 дні
- D. 14 днів
- E. 25 днів

172. Вкажіть, яку обробку рук необхідно здійснити після зняття засобів індивідуального захисту (захисний одяг, маски, респіратори, тощо):

- A. Миття рук антибактеріальним милом
- B. Обробку рук спиртовмісним антисептиком
- C. Миття рук звичайним милом
- D. Миття рук милом і обробка спиртовмісним антисептиком
- E. Не здійснювати обробку рук

173. Пацієнту з підозрою на кишкову непрохідність призначено ендоскопічне дослідження товстого кишечника. До якого дослідження необхідно підготувати пацієнта?

- A. Іригоскопії
- B. Ректороманоскопії
- C. Колоноскопії
- D. Фіброгастроскопії

Е. Холангіографії

174. Акушерка визначає пацієнтці пульс. Не знімаючи пальців з артерії, вона припиняє тиск на неї та встановлює, що пульсація з'явилася через деякий час. Оцініть характеристику пульсу, яку визначила акушерка.

- A. Пульс ниткоподібний
- B. Пульс хорошого наповнення
- C. Пульс слабкого напруження
- D. Пульс доброго напруження
- E. Пульс слабкого наповнення

175. У важкохворого пацієнта, який перебуває в Хоспісі, медична сестра в поперековій ділянці виявила стійку гіперемію, що не зникає після припинення тиску. Шкіра не ушкоджена. Вкажіть ступінь розвитку пролежня:

- A. IV ступінь
- B. II ступінь
- C. III ступінь
- D. I ступінь
- E. V ступінь

176. Вкажіть впродовж якого часу медичні вироби, простерилізовані повітряним методом без упаковки, можуть зберігатися у спеціальних камерах для стерильних матеріалів, обладнаних бактерицидними (ультрафіолетовими) лампами, або на стерильних столах, накритих стерильними простирадлами:

- A. 12 год
- B. 3 год
- C. 10 год
- D. 6 год
- E. 24 год

177. У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет, в нічний час виникло сповільнене глибоке дихання, яке супроводжується шумним вдихом і посиленням видихом. Визначте патологічний тип дихання.

- A. Дихання Біота
- B. Дихання Куссмауля
- C. Дихання Чейна-Стокса
- D. Брадипное
- E. Апноє

178. У пацієнтки після тривалого внутрішньовенного введення ліків акушерка відмітила гіперемію навколо вени, ущільнення у вигляді тяжа, болючість при пальпації, місцеву гіпертермію. Яка проблема виникла у пацієнтки?

- A. Інфільтрат
- B. Повітряна емболія
- C. Флебіт
- D. Гематома
- E. Ліподистрофія

179. 26-річна пацієнтка, вагітність II, 38 тиж., поступила до пологового будинку зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота. Під час огляду перейми по 30 сек. через 3 хв., середньої

сили. Внутрішнє акушерське дослідження: піхва вільна, шийка матки зглажена, зів відкритий на 2,5 см, плідний міхур відсутній. Вкажіть, яке вилиття вод відбулося у жінки?

- A. Раннє вилиття
- B. Передчасне вилиття
- C. Вчасне вилиття
- D. Фізіологічне вилиття
- E. Запізнiле вилиття

180. Під час піхвового обстеження вагітної, на голівці плода, розміщеній у порожнині малого тазу, пальпуються мале й велике тім'ячка на одному рівні. Стріловидний шов у прямому розмірі, мале тім'ячко повернене до крижів, велике — до лона. Про яке передлежання плода можна думати?

- A. Задній вид потиличного
- B. Лицеве
- C. Асинклітичне
- D. Передній вид потиличного
- E. Передньоголовне

181. У вагітної жінки при вимірюванні основних розмірів тазу встановлено, що *d.spinatum* дорівнює 26 см, *d.cristarum* - 28 см, *d.trochanterica* - 31 см, зовнішня кон'югата - 20 см. Індекс Соловйова 13 см. Визначте величину справжньої кон'югати.

- A. 12,5 см
- B. 12 см
- C. 11 см
- D. 11,5 см
- E. 10 см

182. Під час бімануального обстеження у пацієнтки з вагітністю раннього терміну виявлена асиметрія матки, лівий кут матки виступає значно більше ніж правий. Яка ознака раннього терміну вагітності визначається?

- A. Снегірьова
- B. Піскачека
- C. Гентера
- D. Горвіца-Гегара
- E. Губарева

183. У роділлі з повторною вагітністю наприкінці I періоду пологів після вилиття навколоплідних вод з'явилася задишка, кашель, біль за грудиною, відчуття страху. Яке ускладнення виникло у жінки?

- A. Негоспітальне пневмонія
- B. Стенокардія
- C. Інфаркт міокарда
- D. Емболія навколоплідними водами
- E. Розрив матки

184. У жіночу консультацію звернулася вагітна. Під час акушерського обстеження, використовуючи 4 прийоми Леопольда, з'ясувалося, що справа пальпується гладка, рівна поверхня; над входом у таз пальпується щільна, балотуюча частина плода. Визначте положення, позицію, передлежання плода.

- A. Косе положення, 1 позиція, головне передлежання
- B. Поздовжнє положення, 1 позиція, тазове передлежання



- С. Поперечне положення, 2 позиція, головне передлежання
- Д. Поздовжнє положення, 2 позиція, головне передлежання
- Е. Поздовжнє положення, 2 позиція, тазове передлежання

185. Жінка поступила у відділення патології вагітних у терміні вагітності 39 тижнів зі скаргами на загальну слабкість та зменшену рухливість плода. За даними УЗД діагностовані дистрофічні зміни плаценти. Який із запропонованих методів діагностики допоможе оцінити стан плода?

- А. Кардіотокографія
- В. Амніоскопія
- С. Фетоскопія
- Д. Актографія
- Е. Кордоцентез

186. У 25-річній роділлі II період пологів. При піхвовому дослідженні розкриття шийки матки повне. Плодовий міхур відсутній. Передлежить голівка, яка повністю заповнює крижову западину. Сідничні ості не пропальповуються. Стрілоподібний шов у прямому розмірі виходу з тазу. Де знаходиться голівка?

- А. У порожнині малого тазу
- В. У площині входу в таз
- С. У площині виходу з тазу
- Д. У II площині
- Е. У III площині

187. У 26-річній роділлі вагою 70 кг через 15 хв після народження плода масою 3200 г, довжиною 50 см самостійно виділився послід та 100 мл крові. Матка скоротилась, через 10 хв кровотеча з'явилася знову, крововтрата склала 300 мл. Яка крововтрата вважається допустимою для даної пацієнтки?

- А. 300 мл
- В. 250 мл
- С. 350 мл
- Д. 450 мл
- Е. 400 мл

188. Під час огляду пологових шляхів за допомогою дзеркал акушерка визначила: шийка матки ціла, наявний розрив задньої стінки піхви у нижній третині, шкіри та м'язів промежини, за виключенням зовнішнього сфінктера прямої кишки. Вкажіть ступінь розриву промежини?

- А. Розрив промежини 3 ст. повний
- В. Розрив промежини 1 ступеня
- С. Розрив промежини 3 ступеня
- Д. Розрив промежини 3 ст. неповний
- Е. Розрив промежини 2 ступеня

189. У вагітної в терміні 26-27 тиж. — набряки кінцівок і передньої черевної стінки, АТ 170/110 мм. рт. ст., протеїнурія 0,3 г/добу. Яка акушерська патологія виникла у жінки?

- А. Преєклампсія I ст.
- В. Преєклампсія III ст.
- С. Преєклампсія II ст.
- Д. Набряки під час вагітності
- Е. Гіпертензія під час вагітності

190. У 20-річної роділлі, пологи перші, I період. Під час піхвового обстеження: шийка матки зглажена, розкриття маткового вічка 6 см. Пальпуються сідниці і стопа плода. Плодовий міхур відсутній. Вкажіть передлежання плода.

- A. Нижнє неповне
- B. Неповне сідничне
- C. Нижнє повне
- D. Змішане сідничне
- E. Чисте сідничне

191. 25-річна першовагітна, вагітність доношена, знаходиться у другому періоді пологів. Потуги слабкі, серцебиття плода приглушене, 80–85 уд/хв. При піхвовому дослідженні: відкриття шийки матки повне, голівка плода на тазовому дні; стрілоподібний шов у прямому розмірі площини виходу з малого таза, мале тім'ячко біля лона. Яка тактика ведення пацієнтки?

- A. Накласти вихідні акушерські щипці
- B. Провести кесарів розтин
- C. Накласти високі акушерські щипці
- D. Накласти порожнинні акушерські щипці
- E. Провести екстракцію плода за тазовий кінець

192. Акушерка приймального відділення при обстеженні вагітної за допомогою 2 прийому Леопольда виявила справа щільну округлу частину плода, зліва — частину м'якої консистенції. Передлегла частина не визначається. Яке положення плода в матці?

- A. Тазове
- B. Косе
- C. Сідничне
- D. Головне
- E. Поперечне

193. Після пологів, акушерка оглядає новонародженого: кістки черепа щільні, шви вузькі, сирнистої змазки немає, мацерація шкіри на долонях і стопах, плацента з ознаками кальцинозу і білих інфарктів. Які пологи відбулися?

- A. Вчасні
- B. Передчасні
- C. Запізнілі
- D. Термінові
- E. Фізіологічні

194. Роділля знаходиться у III періоді пологів, 5 хвилин тому народився хлопчик масою 3500 г. Раптово посилились кров'янисті виділення із статевих шляхів, крововтрата досягла 200 мл. Яка подальша тактика акушерки?

- A. Ввести окситоцин
- B. Визначити ознаки відділення плаценти
- C. Провести ручне відділення і виділення плаценти
- D. Розпочати виділення посліду зовнішніми методами
- E. Провести катетеризацію сечового міхура

195. У пацієнтки через кілька годин після нанесення на шкіру колінного суглоба 5% Диклак гелю з'явилися в місці нанесення печіння, еритема, везикульозні та папульозні висипання. Встановіть діагноз.

- A. Справжня екзема
- B. Алергійний дерматит
- C. Кропив'янка
- D. Контактний дерматит
- E. Токсикодермія

196. Під час профілактичного огляду у 35-річної жінки виявлено педикульоз. Виберіть лікарський засіб для місцевого застосування.

- A. Шампунь Дермазол
- B. Лосьйон Дипросалік
- C. Лосьйон Лонцид
- D. Аерозоль Спрегаль
- E. Спрей Бепантен плюс

197. За призначенням лікаря акушерка проводить забір крові у пацієнтки з вени для серологічного дослідження на сифіліс. Яку кількість крові необхідно набрати у пробірку?

- A. 4 мл
- B. 1 мл
- C. 2 мл
- D. 3 мл
- E. 5 мл

198. Під час обстеження вагітної жінки акушерка виявила на шкірі нижньої губи на тлі вогнищевої еритеми і набряку згруповані везикули, які супроводжуються печінням та свербіжем, болючі ерозії. Подібні висипання виникали і раніше. На основі цих даних встановіть діагноз.

- A. Алергійний дерматит
- B. Імпетиго
- C. Себорейна екзема
- D. Простий герпес
- E. Кропив'янка

199. Під час огляду дитини, яка народилась два дні тому, виявила прояв сифілісу грудного віку. Про яку ознаку йде мова?

- A. Сифілітичний нежить
- B. Сифілітичну пухирчатку
- C. Розеольозний висип
- D. Паренхіматозний кератит
- E. Дифузну інфільтрацію шкіри

200. Під час проходження онкопрофогляду у 30-річної жінки в цитологічному мазку з поверхні шийки матки виявлено атипові клітини. Який метод дослідження найдоцільніше використати для встановлення діагнозу?

- A. Кольпоскопію
- B. Лапароскопію
- C. Гістероскопію
- D. Цервікоскопію
- E. Кульдоскопію